


• Encuestados: 765; edad: $57,0 \pm 13,2$


• Encuestados diabéticos: 711;

• edad: $57,9 \pm 12,5$. Rango: 11 - 87

	N	Edad
Femenino	436 (61,3%)	$57,4 \pm 13,1$
Masculino	275 (38,7%)	$58,9 \pm 11,5$



Edad	Femenino	Masculino	Total
10 - 19	5	1	6
20 - 29	14	3	17
30 - 39	18	12	30
40 - 49	64	38	102
50 - 59	136	85	221
60 - 69	122	92	214
70 - 79	69	36	105
80 y más	8	8	16
Total	436	275	711




PACIENTES ENCUESTADOS POR PROVINCIA

Provincia	Femenino	Masculino	Total
Chubut	83	64	147
Corrientes	78	36	114
Pcia. Buenos Aires	63	47	110
Gran Buenos Aires	51	36	87
Chaco	50	27	77
Cdad. Buenos Aires	33	23	56
Entre Ríos	42	9	51
Tucumán	15	13	28
Córdoba	9	15	24
Jujuy	9	3	12
Tierra del Fuego	3	2	5
Total	436	275	711


ANTIGÜEDAD DE LA DIABETES (años): $9,0 \pm 8,1$. Rango: 1 mes – 60

Antigüedad de la diabetes (años)	Total
menos de 1 año	43
1 - 4	196
5 - 9	137
10 - 14	120
15 - 19	61
20 - 24	63
25 y más	30
Sin dato	61
Total	711



TRATAMIENTOS (muchos pacientes realizan más de 1 tratamiento)


Tratamiento	Cantidad	% del total
Dieta	474	66,7%
Hipoglucemiantes orales	458	64,4%
Insulina	171	24,1%
Sin tratamiento	66	9,3%




CONTROL OFTALMOLÓGICO ANTERIOR

Último control oftalmológico (años)

	Total (%)
nunca	81 (11,4%)
menos de 1 año	165 (23,2%)
1 - 4	337 (47,4%)
5 - 9	24 (3,4%)
10 - 14	9 (1,3%)
15 y más	5 (0,7%)
sin dato	90 (12,7%)
Total	711




FOTOCOAGULACIÓN PREVIA




DISTRIBUCIÓN POR PATOLOGÍAS ANALIZADAS

Patologías	Cantidad (%)
Sin retinopatía	489 (59,4%)
RD no proliferante leve o moderada	191 (23,2%)
RD no proliferante severa	60 (7,3%)
RD proliferante	27 (3,3%)
Edema macular	42 (5,1%)
Ceguera por diabetes	20 (2,4%)
Otras patologías oculares	149 (18,1%)




FOTOCOAGULACIÓN INDICADA





INDICACIÓN DE SIGUIENTE CONTROL

Próximo control	Total
1 a 3 meses	48
4 a 6 meses	93
7 meses a 1 año	18
1 año	331
Sin dato	221
Total	711



COMPARACIÓN CON CAMPAÑAS ANTERIORES

Año	Pacientes diabéticos	Edad ± desvío estándar	Proporción de encuestados de sexo masculino
2001	1115	57,6 ± 12,9	462 (41%)
2002	612	56,5 ± 14,0	249 (41%)
2003	664	57,0 ± 13,1	254 (38%)
2004	1256	57,7 ± 13,1	524 (42%)
2005	1562	59,7 ± 12,6	646 (41%)
2006	782	58,3 ± 12,2	316 (40%)
2007	823	56,9 ± 13,1	321 (39%)
2008	711	57,9 ± 12,5	275 (39%)




ANTIGÜEDAD DE LA DIABETES

Año	antigüedad de la diabetes ± desvío estándar
2001	9,2 ± 8,5
2002	9,5 ± 8,6
2003	9,7 ± 8,6
2004	9,1 ± 8,3
2005	9,4 ± 8,8
2006	8,7 ± 7,9
2007	8,2 ± 7,9
2008	9,0 ± 8,1

CONTROL OFTALMOLÓGICO ANTERIOR: ANTIGÜEDAD INFERIOR A 4 AÑOS

Año	Menos de 1 año	1 - 4
2001	154 (14%)	324 (29%)
2002	83 (14%)	238 (39%)
2003	93 (14%)	261 (39%)
2004	207 (16%)	531 (42%)
2005	383 (24%)	726 (47%)
2006	465 (21%)	404 (52%)
2007	175 (21%)	316 (38%)
2008	165 (23%)	337 (47%)



FOTOCOAGULACIÓN PREVIA

Año	Fotocoagulación previa
2001	96 (9%)
2002	85 (14%)
2003	72 (11%)
2004	122 (10%)
2005	118 (8%)
2006	43 (6%)
2007	57 (7%)
2008	52 (7%)


TRATAMIENTOS

Año	Dieta	HGO	Insulina	Sin tratamiento
2001	663 (59%)	689 (62%)	181 (16%)	83 (7%)
2002	380 (62%)	368 (60%)	160 (26%)	18 (3%)
2003	360 (54%)	388 (58%)	168 (25%)	46 (7%)
2004	713 (57%)	864 (67%)	246 (20%)	75 (6%)
2005	925 (59%)	1085 (69%)	333 (21%)	91 (6%)
2006	523 (67%)	541 (69%)	144 (18%)	32 (4%)
2007	412 (50%)	509 (62%)	142 (17%)	119 (14%)
2008	474 (67%)	458 (64%)	171 (24%)	66 (9%)


PATOLOGÍAS OBSERVADAS

Año	Sin retinopatía	RD no prolif. leve o moderada	RD no proliferante severa	RD proliferante	Edema macular	Ceguera por diabetes	Otras patologías oculares
2001	666 (60%)	297 (27%)	62 (6%)	58 (5%)	63 (6%)	20 (2%)	126 (11%)
2002	370 (60%)	111 (18%)	52 (8%)	59 (10%)	26 (4%)	12 (2%)	54 (9%)
2003	390 (59%)	140 (21%)	44 (7%)	50 (7%)	37 (6%)	6 (1%)	58 (9%)
2004	823 (65%)	285 (23%)	68 (5%)	51 (4%)	75 (6%)	11 (1%)	181 (14%)
2005	1084 (69%)	309 (20%)	63 (4%)	49 (3%)	93 (6%)	16 (1%)	292 (19%)
2006	512 (65%)	188 (24%)	34 (4%)	46 (6%)	44 (6%)	6 (1%)	134 (17%)
2007	489 (59%)	191 (23%)	60 (7%)	27 (3%)	42 (5%)	20 (2%)	149 (18%)
2008	429 (60%)	165 (23%)	40 (6%)	25 (3%)	46 (6%)	10 (1%)	77 (11%)


Sin retinopatía




RD no proliferante leve o moderada




RD proliferante




RD no proliferante severa



Edema macular



Ceguera por diabetes



FOTOCOAGULACIÓN INDICADA

Año	Fotocoagulación indicada
2001	95 (9%)
2002	67 (11%)
2003	45 (7%)
2004	125 (10%)
2005	82 (5%)
2006	61 (8%)
2007	75 (9%)
2008	38 (5%)

INDICACIÓN DE SIGUIENTE CONTROL

Año	Menos de 1 año	1 año	2 años	Sin especificar / Sin dato
2001	288 (26%)	680 (61%)	10 (1%)	137 (12%)
2002	171 (28%)	271 (44%)	7 (1%)	163 (27%)
2003	137 (21%)	394 (59%)	22 (3%)	111 (17%)
2004	219 (17%)	521 (41%)	11 (1%)	505 (40%)
2005	198 (13%)	470 (30%)	0 (0%)	894 (57%)
2006	131 (17%)	331 (42%)	0 (0%)	320 (41%)
2007	202 (25%)	109 (45%)	1 (0,1%)	250 (30%)
2008	159 (22%)	331 (47%)	0 (0%)	221 (31%)