



CAO | Consejo Argentino de Oftalmología

Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes 2009


Encuestados: 1251

Edad promedio: 58,1


Rango de edades: 5- 93



Sexo	Cantidad	%	Edad promedio
Masculino	502	40,1%	58,06
Femenino	749	59,9%	58,21



Edad	Masculino	Femenino	Total
Hasta 20	9	11	20
20 - 29	9	15	24
30 - 39	24	32	56
40 - 49	64	102	166
50 - 59	149	228	377
60 - 69	157	206	363
70 - 79	75	121	196
80 y más	15	30	45
Total	502	745	1247




Pacientes encuestados por provincia

Año	Pacientes diabéticos	Edad promedio	Proporción de encuestados de sexo masculino
2001	1115	57,6	462 (41%)
2002	612	56,5	249 (41%)
2003	664	57	254 (38%)
2004	1256	57,7	524 (42%)
2005	1562	59,7	646 (41%)
2006	782	58,3	316 (40%)
2007	823	56,9	321 (39%)
2008	711	57,9	275 (39%)
2009	1251	58,1	502 (40%)


Antigüedad de la diabetes

Antigüedad de la DBT	Total
Menos de 1 año	138
1 a 4	453
5 a 9	206
10 a 14	183
15 a 19	101
20 a 24	65
25 y más	56
Sin datos	49
Total	1251




Tratamientos (muchos pacientes realizan más de un tratamiento)

Tratamiento	Cant.	% del total
Dieta	869	69,5%
Hipogl. orales	769	61,5%
Insulina	260	20,8%
Sin tratamiento	75	6,0%




Control oftalmológico anterior

Último control oftalm.	Cant.	%
Menos de 1 año	207	16,5%
1 a 4 años	593	47,4%
5 a 9 años	46	3,7%
10 a 14 años	13	1,0%
15 a 19 años	5	0,4%
20 a 24 años	2	0,2%
25 ó más	0	0,0%
Nunca	189	15,1%
Sin datos	196	15,7%
Total	1251	100%




Fotocoagulación previa

Fotocoag. previa	Cantidad	%
Si	70	5,6%
No	1181	94,4%
Total	1251	100%




Distribución por patologías analizadas

Patologías	Cant.	%
Sin retinopatía	750	60,0%
RD no prolif. leve o moderada	186	14,9%
RD no prolif. severa	50	4,0%
RD proliferante	38	3,0%
Edema macular	56	4,5%
Ceguera por diabetes	15	1,2%
Otras patologías oculares	116	9,3%




Fotocoagulación indicada




Indicación de siguiente control

Próximo control	Cant.	%
1 a 3 meses	48	3,8%
4 a 6 meses	78	6,2%
7 meses a 1 año	4	0,3%
1 año o más	614	49,1%
Sin dato	507	40,5%
Total	1251	100%




Comparación con campañas anteriores

Año	Pacientes diabéticos	Edad promedio	Proporción de encuestados de sexo masculino
2001	1115	57,6	462 (41%)
2002	612	56,5	249 (41%)
2003	664	57	254 (38%)
2004	1256	57,7	524 (42%)
2005	1562	59,7	646 (41%)
2006	782	58,3	316 (40%)
2007	823	56,9	321 (39%)
2008	711	57,9	275 (39%)
2009	1251	58,1	502 (40%)



Control oftalmológico anterior: antigüedad menor a 5 años

Año	Menos de 1 año	1 – 4
2001	154 (14%)	324 (29%)
2002	83 (14%)	238 (39%)
2003	93 (14%)	261 (39%)
2004	207 (16%)	531 (42%)
2005	383 (24%)	726 (47%)
2006	465 (21%)	404 (52%)
2007	175 (21%)	316 (38%)
2008	165 (23%)	337 (47%)
2009	138 (11%)	453 (36%)



Fotocoagulación previa

Año	Fotocoagulación previa
2001	96 (9%)
2002	85 (14%)
2003	72 (11%)
2004	122 (10%)
2005	118 (8%)
2006	43 (6%)
2007	57 (7%)
2008	52 (7%)
2009	70 (6%)



Tratamientos

Año	Dieta	HGO	Insulina	Sin tratamiento
2001	663 (59%)	689 (62%)	181 (16%)	83 (7%)
2002	380 (62%)	368 (60%)	160 (26%)	18 (3%)
2003	360 (54%)	388 (58%)	168 (25%)	46 (7%)
2004	713 (57%)	864 (67%)	246 (20%)	75 (6%)
2005	925 (59%)	1085 (69%)	333 (21%)	91 (6%)
2006	523 (67%)	541 (69%)	144 (18%)	32 (4%)
2007	412 (50%)	509 (62%)	142 (17%)	119 (14%)
2008	474 (67%)	458 (64%)	171 (24%)	66 (9%)
2009	869 (69%)	769 (61%)	260 (21%)	75 (6%)

Patologías observadas

Año	Sin retinopatía	RD no prolif. leve o moderada	RD no proliferante severa	RD proliferante	Edema macular	Ceguera por diabetes	Otras patologías oculares
2001	666 (60%)	297 (27%)	62 (6%)	58 (5%)	63 (6%)	20 (2%)	126 (11%)
2002	370 (60%)	111 (18%)	52 (8%)	59 (10%)	26 (4%)	12 (2%)	54 (9%)
2003	390 (59%)	140 (21%)	44 (7%)	50 (7%)	37 (6%)	6 (1%)	58 (9%)
2004	823 (65%)	285 (23%)	68 (5%)	51 (4%)	75 (6%)	11 (1%)	181 (14%)
2005	1084 (69%)	309 (20%)	63 (4%)	49 (3%)	93 (6%)	16 (1%)	292 (19%)
2006	512 (65%)	188 (24%)	34 (4%)	46 (6%)	44 (6%)	6 (1%)	134 (17%)
2007	489 (59%)	191 (23%)	60 (7%)	27 (3%)	42 (5%)	20 (2%)	149 (18%)
2008	429 (60%)	165 (23%)	40 (6%)	25 (3%)	46 (6%)	10 (1%)	77 (11%)
2009	750 (60%)	186 (15%)	50 (4%)	38 (3%)	56 (4%)	15 (1%)	116 (9%)

Detalle patologías observadas



Fotocoagulación indicada

Año	Fotocoagulación indicada
2001	95 (9%)
2002	67 (11%)
2003	45 (7%)
2004	125 (10%)
2005	82 (5%)
2006	61 (8%)
2007	75 (9%)
2008	38 (5%)
2009	51 (4%)

Indicación de siguiente control

Año	Menos de 1 año	1 año	Sin especificar / Sin datos
2001	288 (26%)	690 (62%)	137 (12%)
2002	171 (28%)	278 (45%)	163 (27%)
2003	137 (21%)	416 (62%)	111 (17%)
2004	219 (17%)	532 (43%)	505 (40%)
2005	198 (13%)	470 (30%)	894 (57%)
2006	131 (17%)	331 (42%)	320 (41%)
2007	202 (25%)	110 (45%)	250 (30%)
2008	159 (22%)	331 (47%)	221 (31%)
2009	130 (10%)	614 (49%)	507 (41%)