



CAO | Consejo Argentino de Oftalmología

Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes 2010

Campaña 2010: datos generales


Encuestados: 791

Edad promedio: 57,8

Rango de edades: 13-89




Sexo	Cantidad	%	Edad promedio
Masculino	310	39,2%	57,06
Femenino	481	60,8%	58,13




Distribución por edad

Edad	M	F	Total
Hasta 20	10	11	21
20 - 29	7	18	25
30 - 39	7	23	30
40 - 49	38	84	122
50 - 59	86	154	240
60 - 69	97	115	212
70 - 79	50	62	112
80 y más	15	14	29
Total	310	481	791




Pacientes encuestados por provincia




Antigüedad de la diabetes

Antigüedad de la diabetes	Total
Menos de 1 año	46
1 a 4	238
5 a 9	115
10 a 14	117
15 a 19	66
20 a 24	51
25 y más	41
Sin datos	117
Total	791




Tratamientos (muchos pacientes realizan más de un tratamiento)

Tratamiento	Cant.	% del total
Dieta	434	54,9%
Hipogl. orales	482	60,9%
Insulina	157	19,8%
Sin tratamiento	62	7,8%




Control oftalmológico anterior

Último control oftalm.	Cant.	%
Menos de 1 año	119	15,0%
1 a 4 años	146	18,5%
5 a 9 años	341	43,1%
10 a 14 años	55	7,0%
15 a 19 años	11	1,4%
20 a 24 años	2	0,3%
25 ó más	4	0,5%
Nunca	3	0,4%
Sin datos	110	13,9%
Total	791	100%




Fotocoagulación previa

Fotocoag. previa	Cant.	%
Si	37	4,70%
No	754	95,30%
Total	791	100%




Distribución por patologías analizadas

Patologías	Cantidad	%
Sin retinopatía	470	59,4%
RD no proliferante leve o moderada	149	18,8%
RD no proliferante severa	37	4,7%
RD proliferante	23	2,9%
Edema macular	39	4,9%
Ceguera por diabetes	4	0,5%
Otras patologías oculares	126	15,9%




Fotocoagulación indicada

Fotocoag. Indicada	Cant.	%
Si	29	3,7%
No	760	96,3%
Total	789	100%



Indicación de siguiente control

Próximo control	Cant.	%
1 a 3 meses	56	7,1%
4 a 6 meses	42	5,3%
7 meses a 1 año	8	1,0%
1 año o más	266	33,6%
Sin dato	419	53,0%
Total	791	100%




Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes

Datos comparados: 2001- 2010


Cantidades; edades promedio; proporción de encuestados

Año	Pacientes diabéticos	Edad promedio	Proporción de encuestados de sexo masculino
2001	1115	57,6	462 (41%)
2002	612	56,5	249 (41%)
2003	664	57	254 (38%)
2004	1256	57,7	524 (42%)
2005	1562	59,7	646 (41%)
2006	782	58,3	316 (40%)
2007	823	56,9	321 (39%)
2008	711	57,9	275 (39%)
2009	1251	58,1	502 (40%)
2010	791	57,8	310 (39%)



Control oftalmológico anterior: antigüedad menor a 5 años

Año	Menos de 1 año	1 a 4 años	Año	Menos de 1 año	1 a 4 años
2001	14%	29%	2006	21%	52%
2002	14%	39%	2007	21%	38%
2003	14%	39%	2008	23%	47%
2004	16%	42%	2009	11%	36%
2005	24%	47%	2010	15%	19%



Fotocoagulación previa

Año	Fotocoagulación previa
2001	96 (9%)
2002	85 (14%)
2003	72 (11%)
2004	122 (10%)
2005	118 (8%)
2006	43 (6%)
2007	57 (7%)
2008	52 (7%)
2009	70 (6%)
2010	37 (5%)



Tratamientos

Año	Dieta	HGO	Insulina	Sin tratamiento
2001	663 (59%)	689 (62%)	181 (16%)	83 (7%)
2002	380 (62%)	368 (60%)	160 (26%)	18 (3%)
2003	360 (54%)	388 (58%)	168 (25%)	46 (7%)
2004	713 (57%)	864 (67%)	246 (20%)	75 (6%)
2005	925 (59%)	1085 (69%)	333 (21%)	91 (6%)
2006	523 (67%)	541 (69%)	144 (18%)	32 (4%)
2007	412 (50%)	509 (62%)	142 (17%)	119 (14%)
2008	474 (67%)	458 (64%)	171 (24%)	66 (9%)
2009	869 (69%)	769 (61%)	260 (21%)	75 (6%)
2010	434 (55%)	482 (61%)	157 (20%)	62 (8%)

Patologías observadas (ver gráficos en próxima diapositiva)

Año	Sin retinopatía	RD no prolif. leve o moderada	RD no proliferante severa	RD proliferante	Edema macular	Ceguera por diabetes	Otras patologías oculares
2001	666 (60%)	297 (27%)	62 (6%)	58 (5%)	63 (6%)	20 (2%)	126 (11%)
2002	370 (60%)	111 (18%)	52 (8%)	59 (10%)	26 (4%)	12 (2%)	54 (9%)
2003	390 (59%)	140 (21%)	44 (7%)	50 (7%)	37 (6%)	6 (1%)	58 (9%)
2004	823 (65%)	285 (23%)	68 (5%)	51 (4%)	75 (6%)	11 (1%)	181 (14%)
2005	1084 (69%)	309 (20%)	63 (4%)	49 (3%)	93 (6%)	16 (1%)	292 (19%)
2006	512 (65%)	188 (24%)	34 (4%)	46 (6%)	44 (6%)	6 (1%)	134 (17%)
2007	489 (59%)	191 (23%)	60 (7%)	27 (3%)	42 (5%)	20 (2%)	149 (18%)
2008	429 (60%)	165 (23%)	40 (6%)	25 (3%)	46 (6%)	10 (1%)	77 (11%)
2009	750 (60%)	186 (15%)	50 (4%)	38 (3%)	56 (4%)	15 (1%)	116 (9%)
2010	470 (59%)	149 (19%)	37 (5%)	23 (3%)	39 (5%)	4 (1%)	126 (16%)

Detalle patologías observadas



Fotocoagulación indicada

Año	Fotocoagulación indicada
2001	95 (9%)
2002	67 (11%)
2003	45 (7%)
2004	125 (10%)
2005	82 (5%)
2006	61 (8%)
2007	75 (9%)
2008	38 (5%)
2009	51 (4%)
2010	29 (4%)

Indicación de siguiente control

Año	Menos de 1 año	1 año	Sin especificar / Sin datos
2001	288 (26%)	690 (62%)	137 (12%)
2002	171 (28%)	278 (45%)	163 (27%)
2003	137 (21%)	416 (62%)	111 (17%)
2004	219 (17%)	532 (43%)	505 (40%)
2005	198 (13%)	470 (30%)	894 (57%)
2006	131 (17%)	331 (42%)	320 (41%)
2007	202 (25%)	110 (45%)	250 (30%)
2008	159 (22%)	331 (47%)	221 (31%)
2009	130 (10%)	614 (49%)	507 (41%)
2010	106 (13%)	266 (14%)	419 (53%)

¡Muchas gracias!

Consejo Argentino de Oftalmología

Junio de 2011

