



CAO | Consejo Argentino de Oftalmología

Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes 2011

Datos generales


Encuestados: 1854

Edad promedio: 57,8

Rango de edades: 13-87




Sexo	Cantidad	%
Masculino	812	43,8%
Femenino	1042	56,2%
Total	1854	100%




Distribución por edad

Edad	M	F	Total
Sin dato	3	2	5
Hasta 20	9	20	29
20 - 29	16	35	51
30 - 39	28	75	103
40 - 49	131	165	296
50 - 59	222	318	540
60 - 69	250	257	507
70 - 79	124	136	260
80 y más	29	34	63
Total	812	1042	1854




Pacientes encuestados por provincia




Antigüedad de la diabetes

Antigüedad de la diabetes	Total
Sin datos	116
Menos de 1 año	109
1 a 4	632
5 a 9	358
10 a 14	299
15 a 19	119
20 a 24	113
25 y más	107
No sabe	1
Total	1854




Tratamientos (muchos pacientes realizan más de un tratamiento)

Tratamiento	Cant.	% del total
Dieta	280	15,1%
Hipogl. orales	1158	62,5%
Insulina	1174	63,3%
Sin tratamiento	453	24,4%




Control oftalmológico anterior

Último control oftalm.	Cant.	%	Último control oftalm.	Cant.	%
Sin datos	321	18,0%	15 a 19 años	5	0,3%
Menos de 1 año	288	16,2%	20 a 24 años	4	0,2%
1 a 4 años	1064	59,7%	25 o más	2	0,1%
5 a 9 años	73	4,1%	Nunca	61	3,4%
10 a 14 años	36	2,0%	Total	1782	100%




Fotocoagulación previa

Fotocoag. previa	Cant.	%
Si	158	8,5%
No	1696	91,5%
Total	1854	100%




Vitrectomía previa

Vitrectomía previa	Cant.	%
Si	46	2,5%
No	1808	97,5%
Total	1854	100%




Distribución por patologías analizadas

Patologías	Cantidad	%
Sin retinopatía	1023	55,2%
RD no proliferante leve o moderada	299	16,1%
RD no proliferante severa	98	5,3%
RD proliferante	97	5,2%
Edema macular	153	8,3%
Ceguera por diabetes	49	2,6%
Otras patologías oculares	391	21,1%



Indicaciones

Indicaciones	Cant.	%
Corticoides intravítreos	18	1,0%
Tratamiento antiangiogénico	56	3,0%
Fotocoagulación	98	5,3%




Inyecciones

Inyecciones	Cant	%
Si	43	2,3%
No	1811	97,7%



Indicación de siguiente control

Próximo control	Cant.	%
Sin datos	320	17,3%
1 a 3 meses	165	8,9%
4 a 6 meses	229	12,4%
7 meses a 1 año	1125	60,7%
1 año o más	15	0,8%
Total	1854	100%




Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes

Datos comparados: 2001- 2011


Cantidades; edades promedio; proporción de encuestados

Año	Pacientes diabéticos	Edad promedio	% de encuestados de sexo masculino
2001	1115	57,6	462 (41%)
2002	612	56,5	249 (41%)
2003	664	57	254 (38%)
2004	1256	57,7	524 (42%)
2005	1562	59,7	646 (41%)
2006	782	58,3	316 (40%)
2007	823	56,9	321 (39%)
2008	711	57,9	275 (39%)
2009	1251	58,1	502 (40%)
2010	791	57,8	310 (39%)
2011	1854	57,8	812 (44%)



Control oftalmológico anterior: antigüedad menor a 5 años

Año	Menos de 1 año	1 a 4 años	Año	Menos de 1 año	1 a 4 años
2002	14%	39%	2007	21%	38%
2003	14%	39%	2008	23%	47%
2004	16%	42%	2009	11%	36%
2005	24%	47%	2010	15%	19%
2006	21%	52%	2011	15%	57%



Fotocoagulación previa

Año	Fotocoagulación previa
2002	85 (14%)
2003	72 (11%)
2004	122 (10%)
2005	118 (8%)
2006	43 (6%)
2007	57 (7%)
2008	52 (7%)
2009	70 (6%)
2010	37 (5%)
2011	158 (8%)



Tratamientos

Año	Dieta	HGO	Insulina	Sin tratamiento
2002	380 (62%)	368 (60%)	160 (26%)	18 (3%)
2003	360 (54%)	388 (58%)	168 (25%)	46 (7%)
2004	713 (57%)	864 (67%)	246 (20%)	75 (6%)
2005	925 (59%)	1085 (69%)	333 (21%)	91 (6%)
2006	523 (67%)	541 (69%)	144 (18%)	32 (4%)
2007	412 (50%)	509 (62%)	142 (17%)	119 (14%)
2008	474 (67%)	458 (64%)	171 (24%)	66 (9%)
2009	869 (69%)	769 (61%)	260 (21%)	75 (6%)
2010	434 (55%)	482 (61%)	157 (20%)	62 (8%)
2011	1158 (62%)	1174 (63%)	453 (24%)	280 (15%)

Patologías observadas (ver gráficos en próxima diapositiva)

Año	Sin retinopatía	RD no prolif. leve o moderada	RD no proliferante severa	RD proliferante	Edema macular	Ceguera por diabetes	Otras patologías oculares
2002	370 (60%)	111 (18%)	52 (8%)	59 (10%)	26 (4%)	12 (2%)	54 (9%)
2003	390 (59%)	140 (21%)	44 (7%)	50 (7%)	37 (6%)	6 (1%)	58 (9%)
2004	823 (65%)	285 (23%)	68 (5%)	51 (4%)	75 (6%)	11 (1%)	181 (14%)
2005	1084 (69%)	309 (20%)	63 (4%)	49 (3%)	93 (6%)	16 (1%)	292 (19%)
2006	512 (65%)	188 (24%)	34 (4%)	46 (6%)	44 (6%)	6 (1%)	134 (17%)
2007	489 (59%)	191 (23%)	60 (7%)	27 (3%)	42 (5%)	20 (2%)	149 (18%)
2008	429 (60%)	165 (23%)	40 (6%)	25 (3%)	46 (6%)	10 (1%)	77 (11%)
2009	750 (60%)	186 (15%)	50 (4%)	38 (3%)	56 (4%)	15 (1%)	116 (9%)
2010	470 (59%)	149 (19%)	37 (5%)	23 (3%)	39 (5%)	4 (1%)	126 (16%)
2011	1023 (55%)	299 (16%)	98 (5%)	97 (5%)	153 (8%)	49 (3%)	391 (21%)

Detalle patologías observadas



Fotocoagulación indicada

Año	Fotocoagulación indicada
2002	67 (11%)
2003	45 (7%)
2004	125 (10%)
2005	82 (5%)
2006	61 (8%)
2007	75 (9%)
2008	38 (5%)
2009	51 (4%)
2010	29 (4%)
2011	98 (5%)

Indicación de siguiente control

Año	Menos de 1 año	1 año	Sin especificar / Sin datos
2002	171 (28%)	278 (45%)	163 (27%)
2003	137 (21%)	416 (62%)	111 (17%)
2004	219 (17%)	532 (43%)	505 (40%)
2005	198 (13%)	470 (30%)	894 (57%)
2006	131 (17%)	331 (42%)	320 (41%)
2007	202 (25%)	110 (45%)	250 (30%)
2008	159 (22%)	331 (47%)	221 (31%)
2009	130 (10%)	614 (49%)	507 (41%)
2010	106 (13%)	266 (14%)	419 (53%)
2011	1519 (82%)	15 (1%)	320 (17%)

¡Muchas gracias!

Consejo Argentino de Oftalmología

Junio de 2011

