



CAO | Consejo Argentino de Oftalmología

**Campaña Nacional de Prevención
de Ceguera por Diabetes 2013**

Datos generales


Encuestados: 2888

Edad promedio: 59,4

Rango de edades: 09 a 92 años




Sexo	Cantidad	%
Masculino	1191	41,2%
Femenino	1697	58,8%
Total	2888	100%



Distribución por edad


Edad	M	F	Total
Sin dato	1	0	1
Hasta 20	13	24	37
20 - 29	33	59	92
30 - 39	58	123	181
40 - 49	153	264	417
50 - 59	341	517	858
60 - 69	373	468	841
70 - 79	178	181	359
80 y más	41	61	102
Total	1191	1697	2888



Pacientes encuestados por provincia


Provincia	Cant.	%
CABA	168	5,8%
Buenos Aires	729	25,2%
Catamarca	135	4,7%
Chaco	54	1,9%
Chubut	145	5,0%
Córdoba	117	4,1%
Corrientes	48	1,7%
Entre Ríos	319	11,0%
La Pampa	39	1,4%
Mendoza	277	9,6%
Misiones	56	1,9%
Neuquén	19	0,7%
Río Negro	20	0,7%
Salta	81	2,8%
San Juan	44	1,5%
Santa Cruz	12	0,4%
Santa Fe	463	16,0%
Santiago del Est.	39	1,4%
Tucumán	123	4,3%
Total	2888	100%

Detalle de pacientes encuestados por provincia



Antigüedad de la diabetes

Antigüedad de la diabetes	Total
Menos de 1 año	105
1 año	328
2 a 4 años	604
5 a 9 años	590
10 a 14 años	425
15 a 19 años	218
20 a 24 años	192
25 y más	150
Debut	276
Total	2888




Tratamientos (muchos pacientes realizan más de un tratamiento)

Tratamiento	Cant.	% del total
Dieta	1676	58,0%
Hipogl. orales	1893	65,5%
Insulina	794	27,5%
Sin tratamiento	443	15,3%




Control oftalmológico anterior

Último control oftalmológico	Cant.	%
Menos de 1 año	385	13,3%
1 año	1110	38,4%
2 a 4 años	663	23,0%
5 a 9 años	176	6,1%
10 a 14 años	55	1,9%
15 a 19 años	5	0,2%
20 a 24 años	14	0,5%
25 o más	12	0,4%
Nunca	468	16,2%
Total	2888	100%




Fotocoagulación previa

Fotocoagulación previa	Cant.	%
Si	255	8,8%
No	2633	91,2%
Total	2888	100%




Vitrectomía previa

Vitrectomía previa	Cant.	%
Si	88	3,0%
No	2800	97,0%
Total	2888	100%




Distribución por patologías analizadas

Patologías	Cantidad	%
Sin retinopatía	1316	45,6%
RD no proliferante leve o moderada	504	17,5%
RD no proliferante severa	158	5,5%
RD proliferante	195	6,8%
Edema macular	256	8,9%
Ceguera por diabetes	56	1,9%
Otras patologías oculares	522	18,1%




Indicaciones

Indicaciones	Cant.	%
Corticoides intravítreos	7	0,2%
Tratamiento antiangiogénico	105	3,6%
Fotocoagulación	211	7,3%




Inyecciones

Inyecciones	Cant	%
Si	108	3,7%
No	2780	96,3%




Indicación de siguiente control

Próximo control	Cant.	%
Sin datos	470	16,3%
1 a 3 meses	376	13,0%
4 a 6 meses	492	17,0%
7 meses a 1 año	1511	52,3%
1 año o más	39	1,4%
Total	2888	100%




Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes

Datos comparados: 2001- 2013

The background features a gradient from light blue at the top to a darker blue at the bottom. Overlaid on this gradient are several large, semi-transparent, light blue geometric shapes, including a large circle and several overlapping arcs, creating a modern, abstract design.

Cantidades; edades promedio; proporción de encuestados


Año	Pacientes diabéticos	Edad promedio	Proporción de encuestados de sexo masculino
2001	1115	57,6	462 (41%)
2002	612	56,5	249 (41%)
2003	664	57	254 (38%)
2004	1256	57,7	524 (42%)
2005	1562	59,7	646 (41%)
2006	782	58,3	316 (40%)
2007	823	56,9	321 (39%)
2008	711	57,9	275 (39%)
2009	1251	58,1	502 (40%)
2010	791	57,8	310 (39%)
2011	1854	52,8	812 (43,8%)
2013	2888	59,4	1191 (41,2%)



Control oftalmológico anterior: antigüedad menor a 5 años

	Menos de 1 año	1 a 4 años
2001	14%	29%
2002	14%	39%
2003	14%	39%
2004	16%	42%
2005	24%	47%
2006	21%	52%
2007	21%	38%
2008	23%	47%
2009	11%	36%
2010	15%	19%
2011	16%	57%
2013	38%	23%

■ Menos de 1 año ■ 1 a 4 años



Fotocoagulación previa

Año	Fotocoagulación previa
2001	96 (9%)
2002	85 (14%)
2003	72 (11%)
2004	122 (10%)
2005	118 (8%)
2006	43 (6%)
2007	57 (7%)
2008	52 (7%)
2009	70 (6%)
2010	37 (5%)
2011	158 (8,5%)
2013	255 (8,8%)



Tratamientos

Año	Dieta	HGO	Insulina	Sin tratamiento
2001	663 (59%)	689 (62%)	181 (16%)	83 (7%)
2002	380 (62%)	368 (60%)	160 (26%)	18 (3%)
2003	360 (54%)	388 (58%)	168 (25%)	46 (7%)
2004	713 (57%)	864 (67%)	246 (20%)	75 (6%)
2005	925 (59%)	1085 (69%)	333 (21%)	91 (6%)
2006	523 (67%)	541 (69%)	144 (18%)	32 (4%)
2007	412 (50%)	509 (62%)	142 (17%)	119 (14%)
2008	474 (67%)	458 (64%)	171 (24%)	66 (9%)
2009	869 (69%)	769 (61%)	260 (21%)	75 (6%)
2010	434 (55%)	482 (61%)	157 (20%)	62 (8%)
2011	280 (15,1%)	1158 (62,5%)	1174 (63,3%)	453 (24,4%)
2013	1676 (58%)	1893 (65,5%)	794 (27,5%)	443 (15,3%)

Patologías observadas

Año	Sin retinopatía	RD no prolif. leve o moderada	RD no proliferante severa	RD proliferante	Edema macular	Ceguera por diabetes	Otras patologías oculares
2001	666 (60%)	297 (27%)	62 (6%)	58 (5%)	63 (6%)	20 (2%)	126 (11%)
2002	370 (60%)	111 (18%)	52 (8%)	59 (10%)	26 (4%)	12 (2%)	54 (9%)
2003	390 (59%)	140 (21%)	44 (7%)	50 (7%)	37 (6%)	6 (1%)	58 (9%)
2004	823 (65%)	285 (23%)	68 (5%)	51 (4%)	75 (6%)	11 (1%)	181 (14%)
2005	1084 (69%)	309 (20%)	63 (4%)	49 (3%)	93 (6%)	16 (1%)	292 (19%)
2006	512 (65%)	188 (24%)	34 (4%)	46 (6%)	44 (6%)	6 (1%)	134 (17%)
2007	489 (59%)	191 (23%)	60 (7%)	27 (3%)	42 (5%)	20 (2%)	149 (18%)
2008	429 (60%)	165 (23%)	40 (6%)	25 (3%)	46 (6%)	10 (1%)	77 (11%)
2009	750 (60%)	186 (15%)	50 (4%)	38 (3%)	56 (4%)	15 (1%)	116 (9%)
2010	470 (59%)	149 (19%)	37 (5%)	23 (3%)	39 (5%)	4 (1%)	126 (16%)
2011	1023 (55,2%)	299 (16,1%)	98 (5,3%)	97 (5,2%)	153 (8,3%)	49 (2,6%)	391 (21,1%)
2013	1316 (45,6%)	504 (17,5%)	158 (5,5%)	195 (6,8%)	256 (8,9%)	56 (1,9%)	522 (18,1%)

Detalle patologías observadas



Fotocoagulación indicada

Año	Fotocoagulación indicada
2001	95 (9%)
2002	67 (11%)
2003	45 (7%)
2004	125 (10%)
2005	82 (5%)
2006	61 (8%)
2007	75 (9%)
2008	38 (5%)
2009	51 (4%)
2010	29 (4%)
2011	98 (5,3%)
2013	211 (7,3%)

Indicación de siguiente control

Año	Menos de 1 año	1 año	Sin especificar / Sin datos
2001	288 (26%)	690 (62%)	137 (12%)
2002	171 (28%)	278 (45%)	163 (27%)
2003	137 (21%)	416 (62%)	111 (17%)
2004	219 (17%)	532 (43%)	505 (40%)
2005	198 (13%)	470 (30%)	894 (57%)
2006	131 (17%)	331 (42%)	320 (41%)
2007	202 (25%)	110 (45%)	250 (30%)
2008	159 (22%)	331 (47%)	221 (31%)
2009	130 (10%)	614 (49%)	507 (41%)
2010	106 (13%)	266 (14%)	419 (53%)
2011	1519 (81,9%)	15 (0,8%)	320 (17,3%)
2013	2379 (82,4%)	39 (1,4%)	470 (16,3%)



CAO | Consejo Argentino de Oftalmología

¡Muchas gracias!

Mayo de 2014